



รายงานสถานการณ์ ผู้ป่วย COVID-19 ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี

WK21 21 พ.ค. - 27 พ.ค.66

เตียงผู้ป่วยโควิด 19 (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2566)

ผู้ป่วยติดเชื้อ
(PCR & ATK pos with admitted)
+967 ราย

ป่วยสะสม 9,866 ราย

ผู้เสียชีวิต
+5 ราย
เสียชีวิตสะสม 21 ราย

ใส่ท่อช่วยหายใจ
4 ราย


ผู้ป่วยปอดอักเสบ
4 ราย

อัตราการครองเตียงระดับ 2.1-3
6.86 %

เตียงระดับ 3	เตียงทั้งหมด 12 เตียง เตียงใช้ไป 4 เตียง	คงเหลือ 8 เตียง คิดเป็น 66.67 %
เตียงระดับ 2.2	เตียงทั้งหมด 33 เตียง เตียงใช้ไป 0 เตียง	คงเหลือ 33 เตียง คิดเป็น 100 %
เตียงระดับ 2.1	เตียงทั้งหมด 130 เตียง เตียงใช้ไป 8 เตียง	คงเหลือ 122 เตียง คิดเป็น 93.85 %

***ระดับเตียงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนการรักษา

ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดจันทบุรี ปี 2566 (ข้อมูล 30 เม.ย. - 27 พ.ค. 2566)





วันที่ 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2566


ป่วย 377 ราย
 อัตราป่วย 70.9 /แสนประชากร
 ตาย 2 ราย
 อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.53

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา


ป่วย 40 ราย

ตาย 0 ราย

เพศหญิง : เพศชาย
 169 208




สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
 จำแนกตามกลุ่มอาการ



มากที่สุด (ปี) 84
 มีรายงาน (ปี) 21
 น้อยสุด (ปี) 1

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
1. 0-4 ปี	13	51.44	0	0
2... 15-24 ปี	122	184.81	1	0.82
3... 25-34 ปี	63	84.1	1	1.59
4... 35-44 ปี	41	53.75	0	0
5... 45-54 ปี	19	22.96	0	0
6... 5-14 ปี	103	171.81	0	0
7... 55-64 ปี	11	14.71	0	0
8... 65 ปีขึ้นไป	5	6.96	0	0

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายสัปดาห์




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราตาย
1. อ.เมืองจันทบุรี	112	86.13	0	0
2. อ.ท่าใหม่	58	82.21	1	1.72
3. อ.ขลุง	47	83.88	0	0
4. อ.มะขาม	45	138.8	0	0
5. อ.แก่งหางแมว	36	84.82	1	2.78
6. อ.เขาคิชฌกูฏ	25	86.18	0	0
7. อ.นายายอาม	20	58.47	0	0
8. อ.สอยดาว	18	27.68	0	0
9. อ.โป่งน้ำร้อน	14	33.13	0	0
10. อ.แหลมสิงห์	2	6.72	0	0



รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดจันทบุรี ปี 2566



อำเภอ	ตำบล พบการระบาด	ตำบล ระยะเกิดโรค
เมืองจันทบุรี	วัดใหม่ ,ท่าช้าง ,เกาะขวาง	จันทนิมิต ,พลับพลา
แก่งหางแมว	แก่งหางแมว ,พวา	-
นายายอาม	วังโตนด ,นายายอาม	-
ชลุม	บางชัน	ตลกพรม,เชิง,ตรอกนอง
ทำใหม่	เขาบายศรี	ทำใหม่,พลอยแหวน
โป่งน้ำร้อน	ทับไทร	-
มะขาม	มะขาม	ท่าหลวง,ปัดวี
สอยดาว	ปะตง	-
เขาคิชฌกูฏ	-	พลวง,ชากไทย
แหลมสิงห์	-	-



7 ข้อ เลือด อก

อาการ



ไข้สูง
เฉียบพลัน



จุดสีแดงขึ้นตาม
ลำตัว ผิวนหลัง
หรือถ่ายอุจจาระดำ



تبโต กัดเจ็บ
ใต้ชายโครงขวา



อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน



หากมีอาการน่าสงสัย
ให้รีบพบแพทย์ทันที

วิธีการป้องกันไม่ให้ยุงกัด
ยัดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

- >>> โรคไข้เลือดออก
- >>> โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
- >>> โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



1. เก็บบ้าน
ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงเกาะพัก



2. เก็บขยะ
ทำลายเศษภาชนะ
ที่มีน้ำขัง



3. เก็บน้ำ
ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ
ให้มิดชิด
ป้องกันยุงวางไข่

และ
มาตรการ

1V

5U

ขจัดไข่
ขจัดไข่ยุง
ทิ้งน้ำที่ขังล้าง
บนพื้นดิน เพื่อให้
ไข่แห้งตาย

ปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่าง
ต่อเนื่อง
ทุกๆ 7 วัน

ปรับ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์

ปิด
ปิดฝาภาชนะ
ให้สนิท

ปล่อย
ปล่อยปลากินลูกน้ำ

เปลี่ยน
เปลี่ยนน้ำ
ในภาชนะที่
ปิดไม่ได้